

TEKUTÝ LIFTING RADIESSE

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Klient/ka:.....

R.Č.:.....

Telefon:

Email:.....

Ošetřované místo:

.....
.....

Na základě Vašeho požadavku a předchozího vyšetření/ konzultace, Vám bylo ošetřujícím lékařem navrženo ošetření Vaší pleti metodou tekutý lifting RADIESSE. Máte právo se o podstoupení zákroku svobodně rozhodnout, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení výkonů je potřeba Vašeho souhlasu.

INFORMACE O ZÁKROKU

Aktivní dermální výplň obsahuje tělu vlastní látku – hydroxyapatit vápenatý. Používá se k vyhlazení středně těžkých až těžkých obličejových vrásek a záhybů, jako jsou nasolabiální rýhy (záhyby, které se táhnou od koutku nosu ke koutku úst). Navozuje liftingový efekt bez použití skalpelu a to díky novotvorbě vlastního kolagenu, které vede ke zpevnění pokožky, vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje. Účinky výplně jsou viditelné ihned po aplikaci, efekt je dlouhodobý. Samotný výkon trvá přibližně 30 minut, výsledný efekt je okamžitý a v následujících týdnech ještě dobíhá a délka jeho trvání je 12-18 měsíců, byly popsány případy přetrvávání efektu až 24 měsíců.

RADIESSE® se také používá ke korekci ztráty objemu na hřbetu rukou. Vzhledem k tomu, že se jedná o tělu vlastní látku, tak vede k minimálnímu výskytu alergických reakcí.

OPATŘENÍ PŘED ZÁKROKEM

Týden před zákrokem se nedoporučuje užívat vysoké dávky aspirinu, vitamínu E, léky proti zánětu a bolesti a ani léky proti srážlivosti krve.

PRŮBĚH ZÁKROKU

Lékař aplikuje do vybrané oblasti výplňový materiál tenkou kanylou. Před aplikací místo znecitlivíme anestetikem a i součástí výplně je anestetikum, které utlumí vnímání bolesti.

DOPORUČENÍ PO ZÁKROKU

- Nedotýkejte se ošetřované oblasti po dobu 4 hodin po zákroku pro zamezení vzniku infekce. Následně je možné oblast lehce omýt jemnou pleťovou vodou. Následující dny lze použít lehký make-up. Dokud nezmizí počáteční otok a zarudnutí nevystavujte ošetřovanou oblast intenzivnímu teplu (solária, opalování, sauna) a ani silnému chladu.
- 2 dny po ošetření dodržujte klidový režim bez větší fyzické námahy nebo emočních projevů
- 2 týdny vynechte kosmetickou masáž obličeje nebo jakékoliv zásahy v ošetřované oblasti

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SPOJENÉ SE ZÁKROKEM

Jelikož Radiesse obsahuje látky tělu vlastní látku, rizika jsou minimální. Mohou se však vyskytnout tyto nežádoucí účinky.

- Otok, zarudnutí, svědění, mírná bolest v místě vpichu, drobné modřinky
- Mírné místní krvácení, zatvrdlý uzlík v místě vpichu
- V ojedinělých případech změna zbarvení kůže v místě vpichu, projevy podobné akné
- Lehká asymetrie ošetřované oblasti, nedostatečný nebo přehnaný účinek.

Pokud výše zmíněné nežádoucí účinky přetrvávají déle než týden, informujte ošetřujícího lékaře, který Vám navrhne následný postup.

KONTRAINDIKACE

- Těhotenství, kojení
- Alergie na aplikovanou látku
- Neurologické onemocnění
- Infekční onemocnění včetně aktivního herpes labialis (oparu)
- Porucha srážlivosti krve (posoudí lékař)

RADIESSE® a RADIESSE® (+) DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI SPOTŘEBITELE

Kdo by neměl používat RADIESSE® nebo RADIESSE® (+)?

Neměli byste užívat RADIESSE® nebo RADIESSE® (+), pokud máte alergii na kteroukoli složku přípravku, pokud máte v anamnéze závažné alergie, pokud máte poruchu krvácení nebo pokud jste těhotná nebo kojíte. Neměli byste užívat RADIESSE® (+), pokud máte alergii na lidokain nebo jemu podobné léky.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které bych měl vědět o RADIESSE® a RADIESSE® (+)?

Jedním z rizik používání těchto přípravků je neúmyslná injekce do cévy. Pravděpodobnost, že se to stane, je velmi malá, ale pokud se to stane, komplikace mohou být vážné a mohou být trvalé. Tyto komplikace, které byly hlášeny u injekcí do obličeje, mohou zahrnovat abnormality vidění, slepotu, mrtvici, dočasné strupy nebo trvalé zjizvení kůže. Jestliže máte změny ve vidění, známky cévní mozkové příhody (včetně náhlých potíží s mluvením, necitlivosti nebo slabosti v obličeji, pažích nebo nohou, potíže s chůzí, pokleslý obličej, silné bolesti hlavy, závratě nebo zmatenost), bílý vzhled kůže nebo neobvyklou bolest během léčby nebo krátce po ní, měli byste to okamžitě oznámit svému ošetřujícímu lékaři.

Stejně jako u všech postupů, které zahrnují injekci přes kůži, existuje riziko infekce.

Nepoužívejte RADIESSE® nebo RADIESSE® (+), pokud máte kožní infekci, dokud se nezahojí.

Není známo, zda je RADIESSE® nebo RADIESSE® (+) bezpečný nebo účinný ve rtech nebo v oblasti kolem očí.

Mikrokuličky v RADIESSE® a RADIESSE® (+) lze vidět na rentgenových snímcích a CT skenech. Je velmi důležité, abyste svému poskytovateli zdravotní péče řekli, že jste měli kožní výplň RADIESSE® nebo RADIESSE® (+).

Pokud máte v anamnéze herpes, můžete po podání RADIESSE® nebo RADIESSE® (+) zaznamenat propuknutí oparu.

Injekce do hřbetu ruky může způsobit dočasné potíže s prováděním činností. RADIESSE® může způsobit zduřeniny, hrbolky nebo boule na hřbetu ruky a může trvat až 1 rok.

Měli byste minimalizovat namáhavou aktivitu a vyhýbat se intenzivnímu slunečnímu záření nebo teplu po dobu asi 24 hodin po ošetření, dokud nezmizí otoky nebo zarudnutí.

Co bych měl říci svému lékaři před použitím RADIESSE® nebo RADIESSE® (+)?

Informujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud užíváte léky na ředění krve nebo léky, které mohou narušovat srážení krve, jako je aspirin nebo warfarin. Tyto léky mohou zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás objeví modřiny nebo krvácení v místě vpichu. Informujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud máte nějaké onemocnění, zranění nebo postižení ruky, pokud máte v anamnéze velké, vystouplé jizvy nebo pokud jste podstoupili jakékoli jiné kožní ošetření, jako je kožní peeling.

Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky přípravku RADIESSE® nebo RADIESSE® (+)?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích přípravku RADIESSE® používaného na rukou patří modřiny, zarudnutí, otoky, bolest, svědění, zduření nebo hrbolky/boule, potíže s prováděním činností, ztráta citlivosti a další místní vedlejší účinky. Nejčastější nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích RADIESSE® nebo RADIESSE® (+) používaných v obličeji zahrnují modřiny, zarudnutí, otoky, bolest, svědění a další místní nežádoucí účinky.

Toto nejsou všechny možné vedlejší účinky přípravku RADIESSE® nebo RADIESSE® (+). Merz shromažďuje informace o nežádoucích účincích pozorovaných u RADIESSE® a RADIESSE® (+) mimo klinické studie. Tyto události jsou zahrnuty do Informačního průvodce pro pacienty RADIESSE® a RADIESSE® (+) na základě

posouzení závažnosti a potenciálního kauzálního vztahu k RADIESSE® nebo RADIESSE® (+). Seznam těchto příhod naleznete v příručce Patient Information Guide dostupné na www.radiesse.com. Informujte svého poskytovatele zdravotní péče o jakýchkoli vedlejších účincích, které vás obtěžují nebo nezmizí.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z důvodu objektivního hodnocení výsledku.

Datum podpisu:.....

Podpis klienta/ky :

Podpis lékaře.....